


EVACARE®

Crema Vaginal



Clotrimazol 1%

CREMA VAGINAL

Venta Libre
INDUSTRIA ARGENTINA

Lea atentamente esta información antes de comenzar a utilizar este medicamento. Conservar este prospecto. Puede necesitar leerlo nuevamente.

1. ¿Qué contiene EVACARE® crema vaginal? Cada 100 gramos de crema vaginal contiene: principio activo: Clotrimazol 1 gramo. Excipientes: vaselina sólida, vaselina líquida, alcohol cetílico, polioxietileno 20 cetil éter, polisorbato 20, alcohol bencílico, fosfato dibásico de sodio anhidro, fosfato monobásico de sodio monohidratado, ácido fosfórico, propilenglicol, agua purificada.

2. Acción: Acción: antimicótico. **EVACARE®** crema vaginal se utiliza para el tratamiento de algunos hongos que afectan la vagina.

3. ¿Para qué se usa EVACARE® crema vaginal? EVACARE® crema vaginal? EVACARE® crema vaginal se usa para el tratamiento de infecciones en la región genital causada por hongos.

4. ¿Qué factores alteran el equilibrio natural de la vagina? • Cambios hormonales (menstruación, uso de anticonceptivos orales, embarazo, menopausia). • Enfermedades sistémicas agudas o crónicas. • Uso de antibióticos. • Uso de jabones perfumados. • Productos de higiene íntima y ropa ajustada. • Uso de duchas vaginales.


5. ¿Qué personas no pueden usar EVACARE® crema vaginal?: NO USE este medicamento: • Si es alérgico a Clotrimazol, imidazoles en general o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.

6. ¿Qué cuidados debo tener antes de usar EVACARE® crema vaginal? Si tiene problemas con su sistema inmune, por ejemplo, si está en tratamiento con corticoides orales, es portador del VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), padece SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) o diabetes, consulte con su médico antes de usar **EVACARE®** crema vaginal. En caso de fiebre (38°C o más), dolor abdominal, náuseas, dolor lumbar o secreciones vaginales abundantes debe consultar a su médico para descartar otro tipo de enfermedad. No debe iniciar el tratamiento durante el período menstrual o bien procurar terminarlo antes de que comience este período. Se recomienda no mantener relaciones sexuales durante el uso de esta medicación ya que la seguridad y eficacia de los métodos anticonceptivos de látex puede estar disminuida. Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de usar este medicamento. Evitar el contacto con los ojos. No ingerir ya que este medicamento es de uso externo únicamente.

7. ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy usando EVACARE® crema vaginal? Al igual que todos los medicamentos, **EVACARE®** crema vaginal puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Las reacciones adversas con frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles) son: reacciones alérgicas: hipotensión (presión arterial baja), dificultad al respirar, urticaria (ronchas elevadas rojizas que producen picazón). Descamación, picazón, erupción, edema, eritema, quemazón o irritación de la zona genital, molestias vaginales, dolor pélvico y hemorragia vaginal. Dolor abdominal. Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. En caso de que se produzca una reacción alérgica durante su utilización, deberá suspenderse el tratamiento y acudir inmediatamente a su médico. Los signos de una reacción alérgica grave incluyen: erupción de la piel, picazón, hinchazón, algunas veces en la cara o en la boca que causa dificultad para respirar. Debe consultar a un médico si los síntomas empeoran durante el tratamiento o se mantienen tras finalizarlo o si se observa aumento del flujo vaginal, cambios en su aspecto, olor, o si presenta sangrado vaginal.

EVACARE®

Crema Vaginal



Clotrimazol 1%

CREMA VAGINAL

Venta Libre
INDUSTRIA ARGENTINA

8. ¿Cómo se usa EVACARE® crema vaginal? Adultos y adolescentes mayores de 16 años: Abrir el envase y colocar el aplicador vaginal en la boca del pomo e ir presionándolo para llenar hasta la indicación con 5 gramos aproximadamente de **EVACARE®** crema vaginal. Después de lavarse bien las manos, tomar el aplicador vaginal con la carga de la crema e introducirlo cuidadosamente, tan profundo como sea posible, dentro de la cavidad vaginal y luego descargar el contenido en su interior. Realizar este procedimiento por la noche durante 6 días consecutivos. Es más fácil la colocación de la crema si la mujer se encuentra en posición acostada y con las piernas ligeramente flexionadas. Debido a que tanto la vagina como la vulva suelen estar afectadas, la aplicación debe realizarse sobre ambas áreas (desde los genitales externos hasta el ano). En el caso de olvido de una dosis a la noche, puede aplicarla durante la mañana. No aplique una dosis doble para compensar la dosis olvidada. En caso de que los síntomas persistan por más de 7 días, se debe consultar con el médico. Las infecciones recurrentes pueden indicar una causa médica subyacente. Se debe consultar con el médico si los síntomas vuelven dentro de los 2 meses.

9. ¿Cómo evitar futuras ocurrencias? • Utilizar ropa suelta, • preferir la ropa interior de algodón, • evitar el uso de prendas de material sintético y muy ajustadas, • evitar el lavado genital con esponjas o con materiales abrasivos, • cambiar periódicamente las toallas higiénicas íntimas.

10. Modo de uso: 1) lavarse bien las manos con agua y jabón. 2) quitar la tapa de la crema y colocar el aplicador reutilizable en la boca del pomo enroscándolo. 3) comenzar a presionar el envase y llenar con crema hasta la indicación marcada en el aplicador, con 5 gramos aproximadamente de **EVACARE®** crema vaginal. 4) sacar el aplicador del envase e introducirlo de manera cuidadosa y tan profundo como sea posible dentro de la cavidad vaginal; hacer presión sobre el émbolo para vaciar el contenido. 5) retirar el aplicador de la vagina. 6) desacople el émbolo tirando de él para sacarlo del cuerpo del aplicador. Lave ambas piezas con agua tibia y jabón y enjuague bien. No debe utilizar detergentes, no debe colocar el aplicador en agua hirviendo. Vuelva a armar el aplicador introduciendo el émbolo dentro, para reutilizarlo al día siguiente. 7) vuelva a lavar las manos con agua y jabón.

11. ¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si usé más cantidad de la necesaria? Si se aplica más **EVACARE®** crema vaginal del que debe (sobredosis). Si ha aplicado más cantidad de **EVACARE®** crema vaginal, o ante una ingesta accidental, consulte a su médico inmediatamente. Una ingestión accidental puede provocar molestias gastrointestinales y/o vómitos. Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología: • Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247. • Hospital Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777. • Centro Nacional de Intoxicaciones, Tel.: 0800-333-0160. Para otras consultas: Centro de Atención telefónica de Laboratorio Elea Phoenix: 0800-333-3532.

12. Modo de conservación: Conservar a temperatura ambiente hasta 25°C. No utilice **EVACARE®** crema vaginal después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica. Presentación de **EVACARE®** crema vaginal: envase conteniendo 35 gramos de crema y aplicador. ¿Dudas? ¿Consultas? 0800-333-3532 (ELEA). ANMAT responde: 0800-333-1234. **MANTÉNGASE ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 59.830.
Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica. Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina. Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica **0800-333-3532 | elea.com**. Fecha de la última revisión: Junio/2023.

Elea